

เกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพวัตถุอันตราย กำจัดหมัดและเห็บสุนัข ชนิดปลอกคอ

การทดสอบ

1. เครื่องมือและแมลงสำหรับทดสอบ

- 1.1 จานแก้วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 70 มิลลิเมตร พร้อมฝาปิด
- 1.2 กระดาษกรองสำหรับรองพื้นจานแก้ว
- 1.3 แมลงที่ใช้ทดสอบ
 - 1.3.1 หมัดสุนัข (*Ctenocephalides canis*) ระยะตัวเต็มวัย จำนวน 5 ตัว ต่อการทดสอบแต่ละครั้ง
 - 1.3.2 เห็บสุนัข (*Rhipicephalus sanguineus*) ระยะตัวเต็มวัย เพศผู้ จำนวน 5 ตัว ต่อการทดสอบแต่ละครั้ง

2. วิธีทดสอบ

- 2.1 ตัดแบ่งปลอกคอเป็นชิ้นเล็ก ๆ ใส่ในจานแก้ว จานละ 2.0 กรัม
- 2.2 คัดแมลงตามจำนวน ใส่ลงในจานแก้ว ตามข้อ 2.1
- 2.3 นับจำนวนแมลงที่ตาย ที่เวลา 5, 10, 15, 20, 30, 60 นาที และ 24 ชั่วโมง
- 2.4 ทำการทดสอบ 3 ซ้ำ หาค่าเฉลี่ยของอัตราการตายในแต่ละช่วงเวลา และให้มีชุดเปรียบเทียบอีก 1 ชุด

การคำนวณ

คำนวณจำนวนแมลงที่ตายในแต่ละช่วงเวลา เป็นร้อยละ และปรับค่าโดย Abbott's formula

แนวทางการพิจารณา

ต้องทำให้หมัดสุนัขตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในเวลา 1 ชั่วโมง หรือทำให้เห็บสุนัขตายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในเวลา 24 ชั่วโมง